

**Thema Nr. 2**  
(Aufgabengruppe)

Es sind alle Aufgaben dieser Aufgabengruppe zu bearbeiten!

**Aufgabe 1** (12 Punkte)

- (a) Man zeige, dass die beiden Zahlen  $12n + 1$  und  $30n + 2$  für alle  $n \in \mathbb{Z}$  teilerfremd sind.
- (b) Sei  $K$  ein Körper. Man zeige, dass der Polynomring  $K[X]$  unendlich viele irreduzible Polynome enthält.  
(Hinweis: Man verwende z.B. die Idee in Euklids Beweis der Unendlichkeit der Primzahlmenge.)

**Aufgabe 2** (12 Punkte)

Sei  $L/K$  eine Körpererweiterung. Seien  $m, n \in \mathbb{N}$ , sei  $A$  eine  $m \times n$ -Matrix mit Koeffizienten in  $K$  und sei  $b \in K^m$ . Zeigen Sie, dass das lineare Gleichungssystem  $Ax = b$  genau dann eine Lösung  $x \in K^n$  hat, wenn es eine Lösung  $x \in L^n$  hat.

**Aufgabe 3** (12 Punkte)

Sei  $(G, +)$  eine abelsche Gruppe. Die *Torsion*  $T(G)$  von  $G$  ist die Menge aller Elemente endlicher Ordnung von  $G$ . Die Gruppe  $G$  heißt *torsionsfrei*, falls  $T(G) = \{0_G\}$ , wobei  $0_G$  das neutrale Element von  $G$  bezeichnet.

- (a) Sei  $(G, +)$  eine abelsche Gruppe. Zeigen Sie:
- (i)  $T(G)$  ist eine Untergruppe von  $G$ .
  - (ii)  $G/T(G)$  ist torsionsfrei.
- (b) Geben Sie eine unendliche abelsche Gruppe mit nichttrivialer Torsion an.

**Aufgabe 4** (12 Punkte)

Es seien  $p$  eine Primzahl und  $\zeta \in \mathbb{C}$  eine primitive  $p$ -te Einheitswurzel. Es sei  $\mathbb{Z}[\zeta]$  der Durchschnitt aller Teiltringe von  $\mathbb{C}$ , die  $\mathbb{Z}$  und  $\zeta$  enthalten. Weiter seien  $z_0, z_1, \dots, z_{p-1} \in \mathbb{Z}$  und  $x := z_0 + z_1\zeta + \dots + z_{p-1}\zeta^{p-1} \in \mathbb{Q}(\zeta)$ . Zeigen Sie:

- (a)  $\mathbb{Z}[\zeta] = \{y_0 + y_1\zeta + \dots + y_{p-2}\zeta^{p-2} \mid y_0, \dots, y_{p-2} \in \mathbb{Z}\} \subseteq \mathbb{Q}(\zeta)$ .
- (b) Ist  $\frac{x}{p} \in \mathbb{Z}[\zeta]$ , so gilt  $z_0 \equiv \dots \equiv z_{p-1} \pmod{p}$ .

**Aufgabe 5 (12 Punkte)**

Sei  $p$  eine ungerade Primzahl und sei  $\zeta$  eine primitive  $p$ -te Einheitswurzel. Zeigen Sie:

- Die Körpererweiterung  $\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}$  hat genau einen Zwischenkörper  $Z$  vom Grad 2 über  $\mathbb{Q}$ .
- Komplexe Konjugation induziert ein Element der Ordnung 2 in der Galoisgruppe  $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q})$ .
- Der Körper  $Z$  aus (a) ist genau dann ein Unterkörper von  $\mathbb{R}$ , wenn  $p \equiv 1 \pmod{4}$ .